

Een kindje van 6 maanden heeft koorts. Hij weegt 7.5kg en mag Paracetamol IV krijgen.

- Vanaf wanneer spreken we van koorts?
- Hoeveel Paracetamol IV geef je en hoe dien je dit toe?

Een meisje van 12 jaar en 104kg heeft veel pijn, de Paracetamol IV werkt onvoldoende.

- Wat is de volgende stap?

Medicatieberekeningen

Solumedrol (40mg/1ml): te geven 17mg

Zinacef / Cefuroxime (750mg): te geven 450mg

Rocefine (1000mg): te geven 450mg

Amoxiclav (500mg): te geven 350mg

Amoxicilline (1000mg): te geven 600mg

Solumedrol (40mg/1ml): te geven 7mg

Claforan (1000mg/4ml): te geven 825mg

Negaban (1000mg): te geven 750mg

Zovirax (250mg): te geven 125mg

Floxapen (1000mg): te geven 550mg

Flagyl / Metronidazole (500mg/100ml): te geven 425mg

Infuussnelheden

Een kind van 13kg heeft een infuus nodig omwille van veelvuldig braken. Welk soort infuus hang je aan en aan welke inloopsnelheid?

Voor een kind van 5kg?

Voor een kind van 40kg?